



DLP - 6 - 7 - 87485853

Avertissements[®] agricoles

Abonnement

annuel : 160,00 F

à l'ordre

Régisseur de Recettes

DRAF du Nord

SERVICE REGIONAL DU NORD-PAS-DE-CALAIS
Cité Administrative - 59048 LILLE Cedex - Tél. (20) 52.00.25

STATION D'AVERTISSEMENTS
LABORATOIRE REGIONAL D'ANALYSES PHYTOSANITAIRES
Z.A.L. - Rue Roger-Salengro - 62750 LOOS-EN-GOHELLE - Tél. (21) 28.27.27



spécial grandes cultures

BULLETIN TECHNIQUE N° 17 DU 10 JUIN 1987

BLES : Rouille jaune

ORGES DE PRINTEMPS : Oïdium

POMMES DE TERRE : Risques de Mildiou

LIN : Stade régulateur ?

BETTERAVES : Pucerons noirs

Un peu de pucerons verts

POIS : Traitement fongicide



POUR LES AVERTISSEMENTS
TELEMATIQUES
APPELEZ le 36 15
CODE ARTEL
OU
CODE EDIMK

BLES

SITUATION : Epiaison, l'Oïdium est toujours bien installé, la Septoriose risque de monter avec les pluies. Sur des parcelles non protégées jusque là avec des systémiques anti-rouille et Oïdium, on trouve de la ROUILLE JAUNE [Thésée dans l'Oise, Damier à La Bassée (59)] et sur la côte quelques rares cas de Rouille brune. Attention piègeage de quelques cécidomyies.

PRECONISATIONS : Suivre les conseils des précédents bulletins mais tenez compte de la Rouille jaune. En cas de symptôme, **traitez immédiatement** avec un produit efficace (Punch C, Tilt ..., Corbel ..., Corvet CM, Impact, Vigil T, Bayfidan D...).

En cas de forte implantation de Rouille jaune + Oïdium, un produit à base de tridémorphe (Calixine) ou adjonction de 0,5 l de Calixine aux produits précédemment cités peut être utile.

Surveillez vos champs de blé le soir. S'il y a présence de Cécidomyies sur épi, en position de ponte, envisagez un traitement.

ORGES DE PRINTEMPS

SITUATION : La dernière feuille est sortie, l'épiaison est imminente. L'Oïdium est souvent très actif.

PRECONISATIONS : En système intensif, le traitement épi se fera dans quelques jours avec une spécialité efficace sur Oïdium et Helminthosporiose (toutefois ralentie par le froid).

7.1.98

POMMES DE TERRE

SITUATION : Forte croissance, tous les produits de contact Mildiou sont lessivés (30 à 40 mm de pluie selon les secteurs ces derniers jours). Des Doryphores adultes sont trouvés sur repousses.

PRECONISATIONS : **Sur toutes les parcelles**, renouveler dès que possible les traitements Mildiou avec un contact, éventuellement une spécialité contenant un pénétrant (Fulvax, Remiltine, Diametan, Aviso G, Vignor). En cas de détection d'adultes de Doryphores en parcelles, envisagez une intervention insecticide.

LIN

En culture dense, les régulateurs sont parfois utilisés (Cérone LL, Ethéverse à 1,5 l, Terpal 3 l à 30 - 40 cm de longueur. Ces traitements sont à faire avec la plus grande prudence.

BETTERAVES

SITUATION : 8 feuilles et plus, le vol de pucerons verts ne s'est pas développé. Quelques aptères sont trouvés sur betteraves en Flandres, par contre les colonies de pucerons noirs se développent.

PRECONISATIONS : En cas d'amélioration des conditions climatiques (augmentation des températures), **une première intervention insecticide** est à envisager.

POIS

Stade début floraison pour les variétés les plus précoces.

- faible présence d'Anthracnose dans certaines parcelles
- aucun puceron n'est observé.

Une intervention fongicide de protection visant Anthracnose, Botrytis et Mildiou secondaire doit être appliquée à ce stade. Ne pas ajouter d'insecticide, la rémanence de ces produits étant très faible.

DIVERS

L'Equipe chargée des Légumes sera présente aux journées "Portes ouvertes" du CEDRE de Lorgies les 13 et 14 juin.

9 essais Grandes Cultures seront présentés par le Service lors de la journée AGRIMIEUX le 17 juin prochain.

Au cours de cette journée, la Station et le Laboratoire pourront être visités aux heures suivantes : 9 h 30 - 10 h 45 - 14 h - 15 h 15.

